

Додаток 1
до Інструкції з профілактики
та ліквідації сальмонельозу птиці
(пункт 1 розділу III)

**Схема кількості та кратності відбору зразків
для дослідження на сальмонельоз на потужностях (об'єктах) в межах
офіційного контролю, що займаються утриманням стад птиці (продуктивної
птиці яєчних порід, м'ясних порід, племінної птиці, а також продуктивної
яєчної птиці та птиці на м'ясо), та потужностях (об'єктах) з виробництва
птахопродуктів (яєць, м'яса)**

№ з/п	Дослідний об'єкт	Об'єкт аналізу	Дослідний матеріал	Кількість зразків/ кратність відбору	
1	2	3	4	5	
I. Схема проведення контролю сальмонельозу курей-несучок (іншої яєчної продуктивної птиці) у птахогосподарствах					
1	Товарне стадо птиці	Добовий молодняк	труп	10 гол. з кожної партії / при формуванні стада (з машини)	
			підстилка з ящиків для транспортування	загальний зразок 300 г, відібраний з різних ящиків / при формуванні стада (з машини)	
		За два тижні до відкладання яєць:			2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення посліду, скребків, ям тощо/ з кожного пташника, відібрані із 60 різних місць
		кліткове утримання	послід		
		напільне утримання	послід	1 об'єднаний зразок, що складається з 2-х пар шкарпеток (бахіл), які були використані для відбору посліду усередині кожного пташника	
		Продуктивне стадо:			2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення посліду, скребків, ям тощо/з кожного пташника, відібрані із 60 різних місць ***
		кліткове утримання	послід		
		напільне утримання	послід	1 об'єднаний зразок, що складається з 2-х пар шкарпеток (бахіл), які були використані для відбору посліду усередині кожного пташника ***	
		За два тижні до забою птиці:			2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення посліду, скребків, ям тощо/з кожного пташника, відібрані із 60 різних місць ***
		кліткове утримання	послід		
напільне утримання	послід	1 об'єднаний зразок, що складається з 2-х пар шкарпеток (бахіл), які були використані для відбору посліду усередині пташника ***			
2	Продукти птахівництва	Товарне яйце	яйця	2 об'єднані зразки (по 5 яєць кожний) з кожного пташника / 1 раз на місяць	
			змиви з яєць	1 об'єднаний зразок, взятий з поверхні 10 яєць	

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5
		Тушка птиці (при забої продуктивного стада)*	шкіра шиї	5 об'єднаних зразків, що складаються зі зразків шкіри шиї по 10 г, відібраних від 15 тушок птиці після охолодження (5 x 30 г) / 1 раз на тиждень
3	Санітарно-гігієнічний контроль приміщень та обладнання	Обладнання пташника та кормобункер	змиви (пил)	змиви, взяті загалом з площі 900 см ² , або зразки пилу не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву / 1 раз на 16 тижнів)
		Обладнання яйцескладів	змиви	змиви, взяті загалом з площі 900 см ² , або зразки пилу не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву / 1 раз на квартал)
		Обладнання цехів сортування яєць	змиви	змиви, взяті загалом з площі 900 см ² , або зразки пилу не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву / 1 раз на квартал)
		Забійний цех*	змиви по ходу технологічного процесу	змиви, взяті з площі 900 см ² , або зразки пилу не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта, взяті через 1 год. після початку робочого процесу (1 зразок змиву / 1 раз на місяць)
змиви	змиви, взяті загалом з площі 900 см ² , або зразки пилу не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта, взяті через 12 год. після санітарної обробки цеху (1 загальний зразок змиву / 1 раз на місяць)			
4	Корми	Корми (та їх складові тваринного походження)	корми	1 зразок по 0,5 кг з кожної п'ятої партії кормів, що надходить / виробляється для годівлі, за умови вироблення кормів одним виробником
		Обладнання кормоцеху / кормоскладу	змиви	змиви, взяті загалом з площі 900 см ² , або зразки пилу не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву / 1 раз на квартал)

II. Схема проведення контролю сальмонельозу племінної птиці в птахогосподарствах

1	Племінна птиця	Добовий молодняк	труп	10 гол. з кожної партії/при формуванні стада (з машини)	
			підстилка з ящиків для транспортування	змішаний зразок, відібраний з різних ящиків, масою не менше 200 г/ при формуванні стада (або з машини)	
		Чотиритижнева птиця:			
			труп	10 гол. з кожного пташника /1 раз від птиці чотиритижневого віку	
		кліткове утримання	послід	2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення посліду, шкребків, ям тощо/ з кожного пташника	
		напільне утримання	послід	2 об'єднані зразки, що складаються з 5-ти пар шкарпеток (бахіл), які були використані для відбору посліду у кожному пташнику	

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5
		За два тижні до відкладання яєць:		
		кліткове утримання	послід	2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення посліду, шкребків, ям тощо/ з кожного пташника
		напільне утримання	послід	2 об'єднані зразки, що складаються загалом з 5-ти пар шарпеток (бахіл), які були використані для відбору посліду усередині кожного пташника
		Кожен другий тиждень протягом періоду відкладання яєць:		
		кліткове утримання	послід	2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення посліду, шкребків, ям тощо/ з кожного пташника
		напільне утримання	послід	1) 2 об'єднані зразки, що складаються загалом з 5-ти пар бахіл, які були використані для відбору посліду усередині кожного пташника з 20 % корисної площі будівлі; 2) одна пара бахіл, яка була використана для відбору посліду зі всієї корисної площі кожного пташника, та додатково один зразок пилу, зібраний зволженими тканинними тампонами з різних поверхонь пташника, з видимою наявністю пилу, загалом не менше ніж з 900 см ² площі поверхні
		Обладнання цехів, сортування яєць	змиви	змиви з не менш як 10 різних місць дослідного об'єкта, взяті загалом з площі 900 см ² (1 загальний зразок змиву для дослідження / 1 раз на квартал)
2	Санітарно-гігієнічний контроль приміщень та обладнання		змиви у ході технологічного процесу	змиви не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта, взяті загалом з площі 900 см ² , взяті через 1 год. після початку робочого процесу (1 загальний зразок змиву для дослідження / 1 раз на місяць)
3	Забійний цех*	Обладнання забійного цеху	змиви	змиви з не менш як 10 різних місць дослідного об'єкта, взяті загалом з площі 900 см ² , взяті через 12 годин після санітарної обробки цеху (1 загальний зразок змиву для дослідження / 1 раз на місяць)
		Тушка птиці (при забої продуктивного стада)	шкіра шиї	5 об'єднаних зразків, що складаються зі зразків шкіри шиї по 10 г, відібраних від 15 тушок птиці після охолодження (5 x 30 г) / 1 раз на тиждень
4	Корми	Корми (та їх складові тваринного походження)	корми	1 зразок по 0,5 кг з кожної п'ятої партії кормів, що надходять для годівлі, за умови вироблення продукції одним виробником, завезені в один день

1	2	3	4	5	
		Кормообладнання пташника, кормобункер	змиви	змиви не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта, взяті загалом з площі 900 см ² , або зразки пилу (1 загальний зразок змиву або 100 г пилу для дослідження / 1 раз на квартал)	
5	Інкубаторії**	Стіни, обладнання	змив об'єднаний	не менше 10 змивів, взятих загалом з площі 900 см ² з різних місць дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву для дослідження / 1 раз)	
		Інкубаційні лотки		з 5 забруднених лотків загальною площею не менше 900 см ² (1 раз на 16 тижнів)	
		Вивідні лотки		з 900 см ² площі поверхні нижньої частини не менше 5 вивідних лотків, узятий відразу після виведення птиці	
		Вивідні лотки		яєчна шкаралупа	по 10 г з 25 різних лотків (тобто загальна маса 250 г) 1 раз на 16 тижнів
		Інкубаційні яйця		ембріони-задохлики	до 30 шт., які загинули в 12-18-денному віці/ кожна партія
		Яйця, непридатні для інкубації, які ідуть на продаж		яйця	2 об'єднані зразки (по 5 яєць кожний) з кожного пташника/ 1 раз на місяць
		Добовий молодняк		змиви з яєць	1 об'єднаний зразок, взятий з поверхні 10 яєць
			меконій, пух	1 об'єднаний зразок, що складається з 300 г / при виведенні птиці	

III. Схема проведення контролю сальмонельозу в птахогосподарствах з утриманням птиці м'ясних порід або птиці на м'ясо (бройлерів, курей, індиків, качок, гусей, голубів, перепелів, фазанів, страусів тощо)

1	Бройлери, індики, качки, гуси, перепела, голуби, страуси, перепели, фазани, тощо	Добовий молодняк	підстилка з ящиків для транспортування	загальний зразок 300 г, відібраний з різних ящиків / при формуванні стада (з машини)
		Птиця за два тижні перед забоєм	послід	1 об'єднаний зразок, що складається з 2-х пар бахіл, які були використані для відбору посліду усередині кожного пташника
2	Корми	Корми (та їх складові тваринного походження)	корми	1 зразок по 0,5 кг з кожної п'ятої партії кормів, що надходять для годівлі, за умови вироблення продукції одним виробником
3	Санітарно-гігієнічний контроль приміщень та обладнання	Забійний цех*	змиви по ходу технологічного процесу	змиви, взяті загалом з площі 900 см ² через 1 год. після початку робочого процесу не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву для дослідження) / 1 раз на місяць
			змиви	змиви, взяті загалом з площі 900 см ² через 12 годин після санітарної обробки цеху не менш як з 10 різних місць

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5
				дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву для дослідження) / 1 раз на місяць
		Холодильні (морозильні) камери	змиви	не менше 10 зразків змивів з площі 900 см ² з різних місць досліджуваного об'єкта (1 загальний зразок змиву) / 1 раз на місяць
		Обладнання кормоцеху / кормоскладу	змиви	змиви, взяті з площі 900 см ² не менш як з 10 різних місць досліджуваного об'єкта (1 загальний зразок змиву) / 1 раз на квартал

* Контроль проводиться у період забою продуктивного стада птиці; у разі якщо в забійному цеху проводиться забій птиці з різних стад (площадок) /господарств, то контроль проводиться з тією ж періодичністю, але окремо для кожного стада (площадки) / господарства.

** Якщо закладається більше 50000 штук інкубаційних яєць від одного стада, зразки повинні бути відібрані у подвійній кількості.

*** Один раз на рік необхідно відібрати по одному зразку посліду додатково з кожного діючого пташника.