

## Додаток 2

до Інструкції щодо профілактики  
та боротьби з блутангом

(катаральна лихоманка овець)

(пункт 5 Розділу VIII)

### **Критерії визначення періоду, сезонно-вільного від вектора блутангу**

1. Компетентний орган визначає період, сезонно-вільний від вектора блутангу, відповідно до таких критеріїв:

1) результати здійснення моніторингу та/або спостереження щодо блутангу;

2) інформація стосовно видів *Culicoides*, як основних векторів блутангу, поширених в межах території, що має епідеміологічне значення щодо блутангу;

3) відсутність зафіксованих випадків поширення вірусу блутангу в межах території, що має епідеміологічне значення щодо блутангу;

4) зупинення активності вектора блутангу та потенційного вектора блутангу відповідно до інформації, отриманої за результатами здійснення ентомологічного спостереження, визначеного пунктом 5.6 розділу V Інструкції;

5) рівень вилову видів *Culicoides*, які є ймовірними векторами серотипу вірусу блутангу, поширеного в межах території, що має епідеміологічне значення щодо блутангу, є нижчим порівняно із максимальним рівнем виловлених векторів блутангу. У випадку відсутності інформації стосовно максимального рівня виловлених векторів блутангу, критерієм для визначення періоду, сезонно-вільного від вектора блутангу, є відсутність видів *Culicoides imicola* та менше п'яти дорослих особин *Culicoides* на одну аспіраційну пастку;

б) температурні умови, що впливають на активність векторів блутангу в межах території, що має епідеміологічне значення щодо блутангу. Межі температури повинні визначатись на основі екологічної поведінки видів *Culicoides*, які є ймовірними векторами серотипу вірусу блутангу, поширеного в межах території, що має епідеміологічне значення щодо блутангу.